

О туберкулезе

Туберкулез - это инфекционное заболевание, известное человечеству уже много веков. Туберкулезом можно заразиться различными путями и не обязательно в результате прямого контакта с больным. Туберкулезом болеют люди разного пола и возраста. Палочка Коха не различает социального статуса и одинаково заражает бедных и богатых.

В 2016 году показатель заболеваемости туберкулезом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре составил 47,97 на 100 тыс. населения, по сравнению с 2015 годом снизился на 20% (2015 год - 59,92 на 100 тыс. населения) и оказался ниже среднего по Российской Федерации (49,72 на 100 тыс. населения) на 3,5 %.

Анализ статистических данных свидетельствует о стабильной ситуации по туберкулезу в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Болеют туберкулезом преимущественно взрослые с 18 лет (2016 год-95,9%)

Вместе с тем, выше среднеокружной заболеваемость туберкулезом отмечается в Кондинском районе 64,14 на 100 тыс. населения, г. Сургуте 60,81 на 100 тыс. населения, Советском районе 56,37 на 100 тыс. населения, г. Нижневартовске 56,02 на 100 тыс. населения, г. Нефтеюганске 53,44 на 100 тыс. населения, г. Ханты-Мансийске 51,07 на 100 тыс. населения, г. Пыть-Яхе 50,97 на 100 тыс. населения.

В Октябрьском районе показатель заболеваемости в минувшем году составил 31,01 на 100 тыс. населения, что на 25,4 % ниже, чем в 2015 году (41,57 на 100 тыс. населения), на 35,3 % ниже среднеокружного и на 37,6 % ниже среднероссийского показателя за 2016 год.

Заболеваемость в районе имеет волнообразное течение с наибольшим показателем в 2014 году, где составила 70,94 на 100 тыс. населения. За последние три года, начиная с 2014 года, прослеживается снижение заболеваемости среди всего населения. Так заболеваемость с 2014 года снизилась на 56,3 % к 2016 году. Однако имеется по одному случаю заболевания туберкулезом детей в 2015 и 2016 гг.

Реализация профилактических мер в первую очередь начинается с вакцинации новорожденных (БЦЖ). Так, на протяжении последних пяти лет, начиная с 2012 года, вакцинация исполнена на 100%, за исключением минувшего года, года выполнение составило 64,17 % от утвержденного плана.

В большинстве случаев, чтобы заподозрить заболевание, достаточно пройти флюорографию. Согласно действующим нормативам, все здоровые взрослые граждане нашей страны должны проходить флюорографию 1 раз в 2 года. Если же у человека снижен иммунитет или имеются какие-либо хронические заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма, сахарный диабет, заболевание, вызванное иммунодефицитом человека, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки и т.д.), то такие люди имеют повышенный риск заболевания туберкулезом. Подобным пациентам рекомендуется прохождение профилактического осмотра (флюорографии) 1 раз в год.

Тяжесть и агрессивность туберкулеза, сложность его лечения и возможные многочисленные осложнения – причины быть внимательными к своему здоровью. В связи с этим, важной частью профилактики заболевания являются регулярные обследования, проба Манту и ежегодная флюорография, которые дают возможность выявить туберкулез на ранней стадии и максимально сохранить здоровье человека.